



登革熱防治

致家長一封信

親愛的家長，您好：

近期持續有入境民眾被檢出登革熱，校園及社區仍具感染風險。登革熱是一種藉由埃及斑蚊及白線斑蚊叮咬，將登革熱病毒注入人體而傳播的急性傳染病，患者會出現突發性發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹、出血性癍候、白血球減少等症狀。

預防登革熱，清除孳生源是最簡單、有效的方法，請您每週進行積水容器「巡、倒、清、刷」：

- 巡**——經常且仔細「巡檢」居家戶內外周圍花瓶、盛水盤、廢水桶、廢保麗龍、廢寶特瓶、廢棄鍋碗、水缸、盆栽墊盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水物品。
- 倒**——將積水「倒掉」。
- 清**——不要的容器予以分類「清除」，減少容器。
- 刷**——留下的容器應澈底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊。

從事戶外活動或前往登革熱疫區，請務必做好防蚊措施。若家人出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等登革熱疑似症狀時，請儘速就醫，如果經診斷確定感染登革熱，請配合下列注意事項：

- 一、登革熱目前無特效藥，只能採支持療法，請遵照醫師指示服藥、休息、多喝水。
- 二、自發病後五日內，為可傳染期，如未住院請在家休息並注意避免被蚊蟲叮咬，防止登革熱疫情散播。
- 三、做好相關防蚊措施：
 - (一)家中裝設紗窗紗門。
 - (二)穿著淺色長袖衣褲。
 - (三)睡覺時掛蚊帳。
 - (四)使用捕蚊燈或電蚊拍(蚊香僅具驅蚊效果)。
 - (五)使用政府機關核可含 DEET、Picaridin 或 IR-3535 等有效成分之防蚊藥劑。
- 四、家人或鄰居若出現類似症狀，應請他們儘速前往醫療院所就醫，並主動告知 TOCC (旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)。
- 五、立即進行家戶及社區地毯式檢查及清除各種積水容器。
- 六、如接獲衛生單位通知實施強制家戶孳生源檢查或噴藥等緊急防治措施，請務必配合，以避疫情於社區持續擴散及違法受罰。





最根本的 登革熱防蚊方法

神奇防蚊步驟

不用的瓶罐容器請丟棄，需要的容器務必倒乾淨 刷乾淨 晾乾淨，倒置或加蓋

★ 特別注意下列幾個容易積水處：



1 水桶、碗盆、瓶罐



2 盆栽底座、花瓶水



3 保麗龍盒、紙盒、餅乾盒



4 水缸、浴缸、水族箱



5 水溝、水窪



6 帆布、塑膠布



7 輪胎



8 洗衣槽、馬桶



屏東縣政府衛生局 關心您

防疫諮詢專線：08-7388999